


LA GASTROSTOMIE PERCUTANÉE ENDOSCOPIQUE

La pose d'une gastrostomie percutanée a pour but d'**insérer une sonde d'alimentation dans l'estomac**, directement à travers la peau et la paroi de l'estomac.

Elle permet aux patients ne pouvant s'alimenter normalement de **recevoir l'apport calorique et protéique, l'hydratation et la médication** qui leur est nécessaire.

Elle permet ainsi d'éviter l'inconfort d'une sonde nasogastrique. Elle nécessite 2 à 3 jours de surveillance.



Contact

SIÈGE SOCIAL

Boulevard Fulgence Masson 5
7000 Mons

HÔPITAL DE LA LOUVIÈRE - SITE DE JOLIMONT

Rue Ferrer 159
7100 Haine-Saint-Paul
064 23 30 11

HÔPITAL DE LOBBES

Rue de la Station 25
6540 Lobbes
071 59 92 11

HÔPITAL DE NIVELLES

Rue Samiette 1
1400 Nivelles
067 88 52 11

HÔPITAL DE TUBIZE

Avenue de Scandiano 8
1480 Tubize
02 391 01 30

HÔPITAL DE MONS - SITE KENNEDY

Boulevard Kennedy 2
7000 Mons
065 41 75 02

HÔPITAL DE MONS - SITE CONSTANTINOPLÉ

Avenue Baudouin de Constantinople 5
7000 Mons
065 38 55 11

HÔPITAL DE WARQUIGNIES

Rue des Chauffours 27
7300 Boussu
065 38 55 11

www.helora.be

HELORA

CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

GASTROSTOMIE PERCUTANÉE ENDOSCOPIQUE

MONS-CONSTANTINOPLÉ ET WARQUIGNIES

Service de Gastroentérologie



MEDE-DOC-259-V1/Version 01/ Date d'application: 20/03/2024

INDICATIONS

L'examen se déroule dans le service d'endoscopie après la pose d'une perfusion intra-veineuse pour injecter les médicaments nécessaires (sédatif, antibiotique). Dans la majorité des cas, la pose de **la gastrostomie se fera sous anesthésie**.

La pose de la sonde est réalisée via une gastroscopie afin de rechercher d'éventuelles lésions qui contre-indiqueraient la pose de celle-ci et qui permet le repérage du meilleur emplacement.

Après désinfection de la peau, une anesthésie locale est pratiquée au niveau de la paroi pour permettre la pose de la sonde.

La durée de la procédure est d'environ 20 minutes.

La sonde de gastrostomie peut facilement être dissimulée sous les vêtements, elle est donc invisible pour les autres.



RISQUES DE LA PROCÉDURE

Tout acte médical, même conduit dans les meilleures conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la Science et de la réglementation en vigueur, **présente un risque de complications**.

Celles-ci sont peu fréquentes. Il s'agit essentiellement d'une infection, d'une péritonite, d'une hémorragie et de trouble cardio-respiratoire.

Exceptionnellement, certaines complications peuvent apparaître quelques jours après l'intervention (douleurs abdominales, vomissements de sang, selles noires, température...). **Il est alors très important de contacter immédiatement votre médecin via les numéros suivants :**



Mons-Constantinople : 065 35 90 23



Warquignies : 065 35 90 78

APRÈS LA POSE DE LA GASTROSTOMIE

- La réalimentation débutera d'abord par une hydratation à l'eau claire le soir même puis par un liquide de nutrition 24 heures après la pose (le plus souvent discuté avec la diététicienne).
- **Dès le lendemain** de la pose, une désinfection **quotidienne** est nécessaire.
- **Après chaque repas**, l'injection de 50 ml d'eau est indispensable pour nettoyer la tubulure.
- Dès le 3ème jour, une mobilisation de la sonde (l'avancer de 1 à 2 cm et la faire tourner 1 fois) et une vérification de l'étanchéité du montage doivent être **quotidiennes** (par une infirmière).
- Pendant les 15 premiers jours, le pansement devra être refait **tous les jours** par une infirmière.
- Pendant les 15 jours suivants, le pansement devra être refait 3 fois par semaine.
- Après 1 mois, l'orifice est généralement cicatrisé. Il n'y a plus de soin antiseptique à réaliser mais un **nettoyage quotidien** à l'eau et au savon est nécessaire.
- Douche possible sans protection.
- Bain en protégeant la sonde avec un pansement imperméable.