

+IELORA

HÔPITAL DE LOBBES

SERVICE DE PÉDIATRIE

PRÉPARER L'HOSPITALISATION
DE JOUR DE MON ENFANT



LA VEILLE DE L'INTERVENTION

À QUELLE HEURE VENIR À L'HÔPITAL ?

La veille de l'intervention programmée par votre chirurgien, nous vous téléphonerons dans l'après-midi pour vous confirmer l'heure d'admission de votre enfant.

Si vous avez des questions, prenez contact avec le service de pédiatrie au 071/599.361.

LA PRISE DE SANG

Lors de la consultation préopératoire avec l'anesthésiste, une prise de sang devra sans doute être réalisée. Cela permet de s'assurer que l'opération peut être pratiquée sans problème. Pour faire le prélèvement sans douleur, nous vous proposerons l'utilisation du sucre chez les plus petits, de l'Emla ou du Méopa pour les plus grands.

- Le Méopa est un mélange gazeux à respirer dans un masque. Ce produit ne va pas endormir votre enfant, il va le détendre. Il aura à la fois moins peur et moins mal.
- L'Emla est une crème qui contient des anesthésiques locaux. Elle est utilisée pour insensibiliser la peau avant un acte médical douloureux.



HYGIÈNE AVANT L'OPÉRATION


Donnez une douche à votre enfant ; il n'y a pas de savon particulier à utiliser, un savon doux est suffisant (sauf si prescrit par l'anesthésiste). Lavez-lui les cheveux. Les ongles doivent être courts et propres. Pensez à ôter le vernis des ongles des mains ET des pieds. L'enfant ne devra pas porter de bijoux ; pensez à les enlever à la maison.

Pour les enfants qui ont les cheveux longs, ils devront être attachés pour l'intervention.

LE JEÛNE PRÉ-OPÉRATOIRE

Il est exigé d'être à jeun pour toute anesthésie générale. L'anesthésiste vous indiquera les recommandations à suivre en fonction de l'âge de votre enfant. De façon générale, il faut être à jeun à partir de minuit.

Être à jeun signifie qu'il ne faut rien boire ni manger avant l'opération.



LE JOUR DE L'INTERVENTION

ACCUEIL

Présentez vous d'abord au guichet d'accueil de l'hôpital chirurgical (au NIVEAU 0) muni de la carte d'identité de votre enfant afin d'effectuer son admission. Ensuite, vous pourrez vous rendre en pédiatrie.

Arrivés en pédiatrie, vous et votre enfant serez installés en chambre. Il devra se déshabiller et revêtir une blouse d'opération. Un bracelet d'identification lui sera placé au poignet. Il devra le conserver durant tout son séjour hospitalier.

LA PRÉMÉDICATION

Si l'anesthésiste le prescrit, un médicament sera donné à votre enfant avant de descendre en salle d'opération, il s'agit de la prémédication. Elle sert à le calmer et le détendre. Elle est en général donnée par la bouche mais elle peut être différente en fonction du poids de l'enfant. Peu après, un brancardier viendra chercher votre enfant pour le bloc opératoire. Le parent pourra accompagner son enfant et rester près de lui jusqu'à l'intervention.

LA ANESTHÉSIE

Pour endormir votre enfant, l'anesthésiste utilisera un masque. Une perfusion sera également placée dans une veine dès qu'il sera endormi. Elle permettra de lui donner d'autres médicaments. Avec l'anesthésie, il ne verra rien, il n'entendra rien et ne ressentira pas la douleur de l'opération.



LE RÉVEIL

SURVEILLANCE

Votre enfant restera en surveillance en salle de réveil. Après toute anesthésie, ce passage est obligatoire et la durée en salle de réveil est variable (d'une heure à quelques heures). Le personnel surveille le retour à la conscience et donne les médicaments nécessaires pour traiter la douleur.

Dès que votre enfant se réveillera, le bloc opératoire nous préviendra. Un des parents pourra le rejoindre et le rassurer. Après certaines opérations, il est fréquent d'avoir des nausées ou des vomissements pendant les heures suivant le réveil. Des médicaments pourront être donnés à votre enfant afin de diminuer ces effets désagréables.

LA PERFUSION

La perfusion fait circuler dans les veines de l'eau sucrée et salée, de façon lente et continue pour hydrater et nourrir le corps durant l'opération. Elle permet aussi de faire passer dans le sang les produits anesthésiques et ceux qui soulagent la douleur après l'opération, sans refaire à chaque fois une piqûre. Celle-ci sera ôtée dès que votre enfant aura bu, mangé, uriné et après accord de l'anesthésiste.



LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

La douleur est une conséquence prévisible de l'opération même si sa durée et son intensité sont très variables selon les interventions et selon les enfants. Des médicaments seront donnés en salle d'opération afin de prévenir celle-ci. Lors de son retour dans le service, si votre enfant a mal ou ne semble pas soulagé, **n'hésitez pas à solliciter l'équipe soignante**.

Au réveil, votre enfant se plaindra peut-être d'avoir faim ou soif. **Vous devez attendre l'autorisation du personnel soignant avant qu'il ne puisse boire puis manger.**

Pour l'aider à patienter, vous pouvez prévoir d'emporter un **spray humidifiant pour sa bouche et ses lèvres**. Vous pouvez aussi prendre des activités pour l'occuper ou vous rendre en salle de jeux. Prévoyez également des antidouleurs à la maison tels que paracétamol (Perdolan[®], Doliprane[®], dafalgan[®], mobistix[®]...) et ibuprofène (nurofen[®], brufen[®]...) selon la prescription de votre chirurgien.

À EMPORTER DANS LA VALISE

- Un pyjama
- Des pantoufles
- Le doudou, tétine ou autres objets rassurants
- Un nécessaire de toilette
- De quoi l'occuper
- La carte d'identité de votre enfant
- Éventuellement un spray humidifiant



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning most of the page width.



INFOS PRATIQUES



CONSULTATIONS PÉDIATRIQUES

+32 71 59 92 11



CHU HELORA - HÔPITAL DE LOBBES

Rue de la Station 25 159

6540 Lobbes



Facebook
CHU Helora - Jolimont et Lobbes