

EFFETS SECONDAIRES DES COMPRIMÉS DE TEMOZOLOMIDE

Des nausées - vomissements :

- En cas de nausée pendant le traitement avec la radiothérapie, prévenez le personnel de radiothérapie afin que des anti-nauséux vous soient prescrits
- En cas de prise seule, vous recevrez une prescription d'Ondansetron (Zofran) à prendre 30 minutes avant le temozolomide.

Chute des globules blancs : si fièvre (>38°C), il faut vous présenter aux urgences. Si vos globules blancs sont trop bas, un antibiotique à visée préventive par Bactrim Forte® sera prescrit.

Chute des plaquettes sanguines : si apparition d'hématomes, de pétéchies (multiples petits points rouges sur les avant-bras, les jambes) ou de saignements inhabituels, présentez-vous aux urgences.

Aphtes (rare) : traités par bains de bouche 4x/jour.

Fatigue cumulative, manque d'appétit, modification du goût.

Troubles cérébraux de type céphalées ou somnolence (rarement).

Modifications de l'aspect de la peau

Constipation ou au contraire **diarrhée**.

Contacts

HÔPITAL DE LA LOUVIÈRE - SITE JOLIMONT

Rue ferrer 159
7100 Haine-Saint-Paul
064 23 30 11

SERVICE DE RADIOTHERAPIE

064 23 41 88



www.helora.be

HELORA

HÔPITAL DE LA LOUVIÈRE

SITE JOLIMONT

TUMEUR CÉRÉBRALE



RXTH-COM-DOC-018-V1 / Avril 2024

Cette brochure a pour objectif de vous apporter **des informations complémentaires concernant votre prise en charge**. Elle ne remplace pas la relation individuelle et personnelle que vous établirez avec les professionnels de la santé qui vous prendront en charge !

Il existe 3 types de modalité de traitement :

- Soit une prise en charge chirurgicale, suivie d'un complément par radiothérapie (en association ou non à une chimiothérapie orale de type Temozolomide).
- Soit la destruction directe du cancer par radiothérapie en association ou non à une chimiothérapie orale (Temozolomide).
- Soit une action directe par chimiothérapie seule (Temozolomide).

Le choix du traitement est le fruit de la concertation de l'ensemble de l'équipe médicale (oncologues, neurochirurgiens, radiothérapeutes).

RADIOTHÉRAPIE

Etape préparatoire : le scanner de simulation.

Le personnel vous installera confortablement sur la table du scanner et confectionnera **un masque** d'immobilisation thermoformé. L'objectif est d'assurer une immobilisation optimale durant le traitement. Sous le masque, vous pourrez respirer normalement.

Dans certains cas, une IRM (sans masque) peut également être demandée afin de recueillir un maximum d'informations anatomiques en vue de votre traitement.

RÉALISATION DU PLAN DE TRAITEMENT

Cette étape est assurée par l'équipe des physiciens. Ils vont établir votre plan de traitement entièrement personnalisé englobant la lésion tout en évitant les organes critiques. Ce plan est ensuite validé par l'équipe médicale. Cette phase peut prendre une dizaine de jours.

TRAITEMENT

Celui-ci comporte entre **15 et 30 séances** d'une dizaine de minutes, 5 jours par semaine.

EFFETS SECONDAIRES DE LA RADIOTHÉRAPIE

La radiothérapie est généralement très bien tolérée. Vous pourriez toutefois présenter des effets secondaires tels que :


- **une fatigue**, souvent modérée, mais pouvant nécessiter la réalisation de sieste.
- **des maux de tête** pour lesquels de la cortisone peut être prescrite si nécessaire.
- **une perte de cheveux** dont la quantité ou la localisation est très difficile à prévoir. Souvent, la chute des cheveux est limitée, partielle et temporaire. Ils repoussent généralement 2 à 3 mois après la fin du traitement.

CHIMIOTHÉRAPIE

La chimiothérapie utilisée est le Temozolomide. Il s'agit de comprimés à prendre au domicile.

Il existe deux types de prises différentes

- Radiothérapie avec Temozolomide : vous devez alors prendre des comprimés **tous les jours, même les weekends**.
- Temozolomide seul : le traitement est alors pris pendant 5 jours tous les 28 jours (=1 cycle). Le nombre de cycle est déterminé par l'oncologue.



MODALITÉS PRATIQUES

Prise unique par jour minimum 2 heures après un repas et 1 heure avant le repas suivant.

Si radiothérapie, une prise de sang sera réalisée toutes les semaines dans le service.

Avalez les comprimés avec un grand verre d'eau.

Ne pas couper ou écraser les comprimés, touchez-les le moins possible.

Si vous vomissez après avoir pris les comprimés, n'en reprenez pas avant le lendemain.

En cas d'association à la radiothérapie, le temozolomide doit être pris à jeun 1h avant la radiothérapie.

